

Malnutrition

1. Définition des stades de la malnutrition

E43 Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision

On est en présence d'une malnutrition grave lorsque les deux critères suivants sont remplis:

a) Score NRS (Nutritional Risk Screening*) > ou = 5

et

b) BMI < 18.5 kg/m² avec état général diminué

ou

perte de poids involontaire >5% en 1 mois et état général diminué

ou

prises alimentaires entre 0 - 25% des besoins dans la semaine précédente indépendamment de sa volonté

(correspond à la détérioration de l'état nutritionnel de degré 3)

E44.0 Malnutrition protéino-énergétique modérée

On est en présence d'une malnutrition modérée lorsque les deux critères suivants sont remplis:

a) Score NRS > ou = 4

et

b) BMI 18.5 - 20.5 kg/m² avec état général diminué

ou

perte de poids involontaire >5% en 2 mois et état général diminué

ou

prises alimentaires entre 25 - 50% des besoins dans la semaine précédente indépendamment de sa volonté

(correspond à la détérioration de l'état nutritionnel de degré 2)

E44.1 Malnutrition protéino-énergétique légère

On est en présence d'une malnutrition légère lorsque les deux critères suivants sont remplis:

a) Score NRS > ou = 3

et

b) perte de poids involontaire > 5% en trois mois

ou

prises alimentaires entre 50 - 75% des besoins dans la semaine précédente indépendamment de sa volonté

(correspond à la détérioration de l'état nutritionnel de degré 1)

* Kondrup Guidelines for Nutrition Risk Screening 2002. Clin Nutr (2003);22(3):321-336

Tableau expliquant l'attribution du diagnostic de malnutrition CIM:

Degré de la détérioration de l'état nutritionnel		1	2	3
Score NRS*	≥ 5	E44.1	E44.0	E43
	4	E44.1	E44.0	E44.0
	3	E44.1	E44.1	E44.1

2. Codage:

a) Une malnutrition selon CIM-10 **E43** peut être codée lorsqu'**une des** procédures ci-dessous a été effectuée:

89.0A.4- Traitement nutritionnel multimodal

ou

*89.0A.32 Conseil et traitement diététiques
au moins 2 unités de traitement par une diététicienne ES/HES diplômée*

a) Une malnutrition selon CIM-10 **E44** peut être codée lorsqu'**une des** procédures ci-dessous au moins a été effectuée:

89.0A.32 Conseil et traitement diététiques

89.0A.4- Traitement nutritionnel multimodal

96.6 Perfusion intestinale de substances nutritives concentrées, au moins 5 jours de traitement

99.15 Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées, au moins 5 jours de traitement

Remarque :

Lorsque des critères ne sont pas remplis (définition malnutrition et/ou procédure), il faut alors utiliser le code

E 46 Malnutrition protéino-énergétique, sans précision.

* Kondrup Guidelines for Nutrition Risk Screening 2002.Clin Nutr (2003);22(3):321-336